



## Annexe 6 – Classification TNM et stade clinique du mélanome (AJCC 8<sup>e</sup> édition)

Classification T		
Catégorie T	Épaisseur	Ulcération
TX : L'épaisseur du mélanome ne peut être mesurée (eg, diagnostic par curettage)	Non applicable	Non applicable
T0 : Il n'y a pas de tumeur primaire (eg, primaire inconnu ou régression complète du mélanome)	Non applicable	Non applicable
Tis (mélanome <i>in situ</i> )	Non applicable	Non applicable
T1	≤ 1.0 mm	Inconnu ou non spécifié
T1a	< 0.8 mm	Sans ulcération
T1b	< 0.8 mm 0.8-1.0 mm	Avec ulcération Avec ou sans ulcération
T2	> 1.0-2.0 mm	Inconnu ou non spécifié
T2a	> 1.0-2.0 mm	Sans ulcération
T2b	> 1.0-2.0 mm	Avec ulcération
T3	> 2.0-4.0 mm	Inconnu ou non spécifié
T3a	> 2.0-4.0 mm	Sans ulcération
T3b	> 2.0-4.0 mm	Avec ulcération
T4	> 4.0 mm	Inconnu ou non spécifié
T4a	> 4.0 mm	Sans ulcération
T4b	> 4.0 mm	Avec ulcération



Classification N		
Catégorie N	Nombre de ganglions régionaux atteints	Présence de métastases en transit, satellites ou microsatellites
NX :	Les ganglions régionaux n'ont pas été évalués (eg, la biopsie du ganglion sentinelle n'a pas été faite, les ganglions régionaux ont déjà été enlevés pour une autre raison que le mélanome) ; Exception : N histopathologic n'est pas nécessaire pour les mélanomes T1 et l'information clinique est suffisante	Non
N0	Absence de métastase ganglionnaire	Non
N1	1 ganglion atteint ou présence de métastases en transit, satellites ou microsatellites	
N1a	1 ganglion ; atteinte occulte (ie, détectée à la biopsie du ganglion sentinelle)	Non
N1b	1 ganglion détecté cliniquement	Non
N1c	Absence d'atteinte ganglionnaire	Oui
N2	2-3 ganglions atteints ou présence de métastases en transit, satellites ou microsatellites et 1 ganglion atteint	
N2a	2-3 ganglions ; atteinte occulte (ie, détectée à la biopsie du ganglion sentinelle)	Non
N2b	2-3 ganglions ; au moins 1 détecté cliniquement	Non



Classification N		
Catégorie N	Nombre de ganglions régionaux atteints	Présence de métastases en transit, satellites ou microsatellites
N2c	1 ganglion ; atteinte occulte ou détecté cliniquement	Oui
N3	≥ 4 ganglions atteints ou présence de métastases en transit, satellites ou microsatellites et ≥ 2 ganglions atteints ou présence de ganglions adhérents	
N3a	≥ 4 ganglions ; atteinte occulte (ie, détectée à la biopsie du ganglion sentinelle)	Non
N3b	≥ 4 ganglions ; au moins 1 détecté cliniquement ou présence de ganglions adhérents	Non
N3c	≥ 2 ganglions ; atteinte occulte ou détectée cliniquement et/ou présence de ganglions adhérents	Oui



Classification M		
Catégorie M	Site anatomique	Niveau de LDH
M0	Absence de métastases à distance	Non applicable
M1	Présence de métastases à distance	
M1a	Métastases cutanées, tissus mous (incluant musculaires) et/ou ganglions non régionaux	Pas de mesure ou non spécifié
M1a(0)		Normal
M1a(1)		Élevé
M1b	Métastases pulmonaires avec ou sans métastases aux sites anatomiques M1a	Pas de mesure ou non spécifié
M1b(0)		Normal
M1b(1)		Élevé
M1c	Métastases viscérales (sauf du système nerveux central) avec ou sans atteinte des sites anatomiques de M1a et M1b	Pas de mesure ou non spécifié
M1c(0)		Normal
M1c(1)		Élevé
M1d	Métastases système nerveux central avec ou sans atteinte des sites anatomiques de M1a, M1b et M1c	Pas de mesure ou non spécifié
M1d(0)		Normal
M1d(1)		Élevé