



## Chapitre « Troubles gérontopsychiatriques en SLD »

Par Dre Nancy Vasil, M.D. psychiatre et gérontopsychiatre

### Questions d'évaluation

**1. Quel symptôme suggère un trouble bipolaire plutôt qu'un épisode dépressif caractérisé ?**

- a. Insomnie
- b. Concentration pauvre
- c. Irritabilité
- d. Fuite des idées

**Réponse : d)** - Les trois premiers symptômes énumérés peuvent se rencontrer dans les deux diagnostics évoqués. Seule la fuite des idées oriente vers la manie ou l'hypomanie, puisque ce n'est pas un symptôme habituel de dépression.

**2. Lesquelles de ces investigations sont indiquées avant d'initier le lithium ?**

- a. Créatinine, fonction thyroïdienne, électrocardiogramme
- b. Imagerie cérébrale
- c. Tests neuropsychologiques
- d. Profil lipidique et hémoglobine glyquée
- e. Lithémie

**Réponse : a)** - Le lithium augmente le risque de dysfonction rénale, d'hypothyroïdie et d'anomalies de conduction cardiaque. Puisque le lithium n'est pas encore initié, la lithémie est inutile à ce moment. La première lithémie devrait être effectuée 5 jours complets après l'amorce, et 12 heures après la dose.

**3. Quelle est la relation entre l'anxiété et le trouble neurocognitif ?**

- a. L'anxiété est un facteur de risque pour le développement d'un trouble neurocognitif
- b. L'anxiété chronique peut mener à une hyperactivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
- c. L'anxiété peut se développer comme conséquence d'un déclin cognitif
- d. Un cortisol élevé est le médiateur d'une partie des effets cognitifs de l'anxiété chronique
- e. Toutes ces réponses

**Réponse : e)**



**4. Lequel de ces médicaments peut être efficace pour traiter la psychose dans le trouble neurocognitif majeur avec corps de Lewy, sans aggraver les symptômes moteurs ?**

- a. Galantamine
- b. Rivastigmine
- c. Donépézil
- d. Mémantine

**Réponse : b)** - La rivastigmine peut réduire le délire ou les hallucinations dans cette pathologie

**5. Quel type de trouble de la personnalité est le plus commun chez la personne âgée ?**

- a. Non spécifié
- b. Borderline
- c. Obsessionnel-compulsif
- d. Schizotypique
- e. Dépendant

**Réponse : a)** - Les personnes âgées avec trouble de la personnalité présentent souvent un tableau complexe, et les critères du DSM n'ont pas été adaptés aux réalités du vieillissement. Bien que les groupes A (réponse d.) et C (réponses c. et e.) soient plus fréquents que le groupe B (réponse b.), c'est bien le type non spécifié qui est le plus fréquent chez la personne âgée, parce que la présentation est souvent composée de traits de caractère atténués qui appartiennent à divers groupes.